Téledétection et modélisation

Gérard Dedieu

—— Le spatial coopératif ——

- Proposition de définition (limitée à notre propos) :
 - Un modèle est une tentative de représentation de processus du monde réel par un programme informatique
 - Un modèle peut reposer sur une description plus ou moins détaillée (mécaniste) des processus ou statistique

○ Exemple

- A quel heure arriverez vous à Narbonne en partant de Toulouse à 9h00 et en roulant à une vitesse constante (ou moyenne) de 130 km/h ?
 - Le modèle : temps de parcours = distance/vitesse ($t = D / V$)
 - L'application à la question
 - Recueil de données : la distance D est de 151 km
 - Temps de parcours $t = 151/130 = 1,161538462$ heure = 1 heure et $0,161 * 60$ minutes = 1h 9' 41"
 - Heure d'arrivée : 9h00 + 1h 9' 41" = 10 h 9' 41"
 - Nous avons construit un modèle pour effectuer une prévision, le modèle $t=D/V$ peut être modifié pour calculer une vitesse moyenne durant un trajet déjà effectué :
 - $V = D / t$
 - Nous avons simplifié le problème : les phases de décélération et d'accélération ne sont pas prises en compte, leur durée est implicitement jugée négligeable devant le temps de parcours total et les aléas de circulation, leur prise en compte complexifierait inutilement le modèle
 - Il ne nous reste plus qu'à écrire le programme informatique pour traiter n'importe quelle situation similaire

- Estimation de la productivité primaire nette instantanée d'une formation végétale (Kumar et Monteith 1972)

$$P(t) = e(t) \times f(t) \times \varepsilon_c(t) S_0(t)$$

- P : productivité primaire nette (g[c] /m²)
- t : le temps
- S_0 : le rayonnement solaire global
- ε_c : la part de S_0 utile à la photosynthèse PAR (~0,48)
- f : la fraction du PAR absorbée par la canopée
- e : l'efficacité de la conversion du rayonnement solaire absorbé en matière organique sèche (g MJ⁻¹)

Les longueurs d'onde bleue et rouge sont absorbées par la chlorophylle. Les vertes sont très faiblement réfléchies par la feuille. Le rayonnement PIR, lui, est fortement réfléchi par le parenchyme lacuneux.

(adapté d'après Jensen, 2000 Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective)

<https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uvcd/envcal/html/vegetation/caracteristique-vegetation/proprietes.html>

Flux incident = Flux réfléchi + Flux transmis + Flux Absorbé

$$1 = R + T + A$$

Avec Réflectance = Φ réfléchi / Φ incident, etc

Rouge : R = 0,1 T = 0,1 A = 0,8

Indice foliaire (LAI)
 m^2 de feuilles/ m^2 de sol
 LAI = Leaf Area Index

Ici LAI = 1

Proche infrarouge :

$R = 0,5$ $T = 0,45$ $A = 0,05$

Réflectance rouge R = 0,1001

Réflectance proche infrarouge PIR = 0,601

$$\text{Indice de végétation NDVI} = (\text{PIR} - \text{R}) / (\text{PIR} + \text{R}) = 0,71$$

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index

Indice de végétation NDVI = $(PIR - R)/(PIR+R) = 0,75$

V. Demarez et col., CESBIO

Prairies (Mexique)

NDVI comparés de deux cultures d'été (CESBIO)

Leaf Area Index 2007

○ Estimation de la productivité primaire nette instantanée d'une formation végétale (Kumar et Monteith 1972)

$$P(t) = e(t) \times f(t) \times \varepsilon_c(t) S_0(t)$$

- P : productivité primaire nette (g[c] /m²)
- t : le temps
- S₀ : le rayonnement solaire global
- ε_c : la part de S₀ utile à la photosynthèse PAR (~0,48)
- **f : la fraction du PAR absorbée par la canopée**

$$f = a + b \text{ NDVI}$$

- e : l'efficacité de la conversion du rayonnement solaire absorbé en matière organique sèche (g MJ⁻¹)

Figure 7. The relationship between FAPAR and top of the canopy (TOC) NDVI in homogeneous (1D) and heterogeneous (3D) canopies with different leaf orientation distributions. The other problem parameters are as in the base case.

Annual NPP from the ECMWF driven TURC model. Unit is g[C].m⁻².

Estimated global NPP : 66.2 Gt C/yr for 1998 (CESBIO)

Méthode FAO

$$ET_c(t) = K_c(t, crop) \cdot ETP_{ref}(t)$$

Crop coefficient K_c : NDVI derived crop coefficient

$\Rightarrow K_c(t) = f(NDVI(t), \text{crop type})$

(K_c is mainly driven by LAI, and the NDVI as well)

Méthode d'estimation des bilans d'eau

□ Adaptation de la méthode proposée à la FAO par Allen et al. (1998):

Crop Potential Evapotranspiration ET_c in 2002 (water requirement)

The actual evapotranspiration is computed with a simple water balance model (Allen et al. 1998)

$$ETr = Ks.ETc(t) = Ks. Kc(t,crop).ETPref(t)$$

Ks is the normalized water content in the rooting zone
 The size of the rooting zone is driven by satellite NDVI
 Irrigation is applied to recover water content at field capacity when soil moisture drops below a threshold

Zoom over a 5x5 km window

Le forçage

L'assimilation

Variables estimées par un modèle de végétation couplé à un SVAT après assimilation de données Landsat : biomasse, indice foliaire, contenu en eau du sol, ETR, NPP ...

Zone de 150 km² en région aride (Arizona). Deux années 1996, 1997.

Cas relativement simple.

Précision des résultats limitée par le peu de données disponibles.

Nouvellon et al., 2000

FIN